




Poortkatheter



Sint-Maria Halle
ALGEMEEN ZIEKENHUIS

De behandeling van jouw ziekte maakt het veelvuldig aanprikken van de bloedbaan noodzakelijk voor het afnemen van bloedstalen en het toedienen van geneesmiddelen, infusievloeistoffen en bloedproducten. Daarom zal een poortkatheter geplaatst worden. Door de aanwezigheid van een poortkatheter verloopt de toediening vlotter en is er minder irritatie en beschadiging van de bloedvaten.

Wat is een poortkatheter (=PAC)?

De poortkatheter bestaat uit twee delen namelijk een toegangspoort (reservoir) en een katheter. Het systeem wordt volledig onder de huid geplaatst. De poort wordt meestal geplaatst ter hoogte van de borstkas. De katheter wordt in een groot bloedvat ingebracht en opgeschoven totdat de tip zich net boven het hart bevindt.

De ingreep

De plaatsing van een poortkatheter gebeurt in de operatiezaal. Dit kan zowel onder lokale verdoving of korte algemene verdoving.

Bij lokale verdoving

- je hoeft NIET nuchter te zijn
- je moet vervoer voorzien om naar huis te gaan, je mag niet zelf met de wagen rijden
- verblijf in het ziekenhuis is $\pm$ 3u

Bij algemene verdoving

- je moet WEL nuchter te zijn
- je moet vervoer voorzien om naar huis te gaan, je mag niet zelf met de wagen rijden
- verblijf in het ziekenhuis is $\pm$ 4u

Het gebruik van een poortkatheter

Een specifieke naald wordt door de huid en door het membraan van het reservoir geprikt tot op de bodem van het reservoir. Dit gebeurt op een strikt steriele manier. Het enige wat je voelt, is een lichte prik in de huid. Nadien kan er een bloedafname gebeuren, of kunnen er injecties of perfusies gegeven worden.

Je ontvangt een implantatiebewijs waarop de technische gegevens van jouw poort- katheter staan. Draag dit kaartje altijd bij je.

Wat meebrengen bij opname?

- identiteitskaart (indien >12 jaar)
- documenten hospitalisatieverzekering of -kaart (DKV, Medicaard, AssurCard, ...)
> meld dit aan het secretariaat bij inschrijving!
- alle nodige attesten die dienen ingevuld te worden
- lijst met medicatie die je neemt
- draag geen juwelen en
breng geen waardevolle voorwerpen mee

Na uw ingreep

Bij terugkomst op de afdeling controleert de verpleegkundige jouw parameters en het verband van de poortkatheter. Als ook de chirurg langsgesproken is mag je, ongeveer 3 uurtjes later, naar huis.

De verzorging van een poortkatheter

Na de ingreep wordt de wonde steriel afgedekt. Hierboven komt soms een drukverband dat je mag verwijderen na 24 uur.

Het onderste verband laat je ter plaatse. Laat dit droog en gesloten.

In normale omstandigheden worden de hechtingen na 10 tot 14 dagen verwijderd. Vaak worden resorbeerbare hechtingen gebruikt, deze moeten niet verwijderd worden.

De verpleegkundige of jouw huisarts controleert de wondheling na 1 week. Zodra de insnijdingen geheeld en volledig droog zijn, is wondverzorging niet meer nodig. Een verband is nu overbodig en je mag terug baden en douchen.

Je moet wel regelmatig de aanprikplaats controleren. Als deze rood, gezwollen of pijnlijk is, moet je een arts contacteren.


De eerste 48 uur na plaatsing kan je wat last of pijn ervaren. Hiervoor mag je een pijnstiller nemen op basis van paracetamol (bijvoorbeeld Dolprone[®], Dafalgan[®], Perdolan Mono[®], enz.). Neem geen pijnstillers op basis van acetylsalicylzuur (bijvoorbeeld Aspirine[®], Aspegic[®], Aspro[®], Perdolan Compositum[®], enz.).

Gedurende 5 dagen mag je de arm aan de kant van de poortkatheter niet boven schouderhoogte heffen. Vermijd belasting van de arm en schouder.

Nuttige contactgegevens

Bij eventuele problemen, vragen of twijfels kan je steeds terecht

- op het dagziekenhuis tussen 07u en 17u
- tel. 02 363 65 07
- e-mail: dag@sintmaria.be
- bij jouw huisarts
- bij jouw specialist
- bij jouw onco-coach



Heb je na het lezen van deze folder
nog vragen of zijn er nog zaken
onduidelijk, aarzel dan zeker niet om
meer informatie te vragen.