Sint-Maria Halle
ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Dr. Johan PONETTE
Dr. Katrien BULTE
Dr. Guido SPANOGHE
Dr. Thomas VAN NIEUWENHOVE
tél. 02 363 66 00


INFORMATIONS SUR LA COLOSCOPIE APRES-MIDI

Date:

Un rendez-vous a été pris pour vous le .....**â 13 h 45** , à l'hôpital de jour.
Vous devez être **â jeun**.
Un chauffeur doit venir vous chercher au plus tard à 17h30.

Qu'est-ce qu'une coloscopie ?

Une coloscopie est un examen au cours duquel le côlon est examiné au moyen d'un vidéoscope. Les images fortement agrandies sont visualisées sur un écran de télévision.



Preparation :

La veille de l'examen, à 18h00, délayez 1 sachet A et 1 sachet B de Moviprep dans 1 litre d'eau (une boîte contient 2 sachets A et 2 sachets B). Buvez la solution en une heure environ. Buvez ensuite 1 litre d'eau. Vous pouvez alors manger quelques biscottes ou du pain blanc.

Le jour de l'examen, à 08h00, buvez à nouveau 1 litre d'eau dans lequel les sachets A et B restants de Moviprep sont dissous. Buvez cette solution en une heure, puis buvez 1 litre d'eau. Vous ne pouvez rien manger pendant toute la matinée et tout l'après-midi.

L'examen proprement dit :

On vous met une perfusion, puis vous êtes conduit dans la salle d'endoscopie.
Vous y recevez une injection d'antalgique et un somnifère afin de pouvoir supporter l'examen au mieux.
Le coloscope est introduit délicatement par l'anus, jusqu'à l'extrémité du côlon. Ensuite, il est retiré progressivement, afin de réexaminer votre côlon. Si de petits polypes sont observés, ils peuvent être enlevés immédiatement. Pour ce faire, une boucle est introduite dans l'instrument et est serrée autour du polype. Le polype est « coupé » par électrocoagulation. Les deux complications possibles de cette intervention sont une hémorragie et une perforation (un trou dans la paroi intestinale). Le risque de survenue de ces complications est extrêmement faible. Les polypes plus gros ne sont pas éliminés à l'hôpital de jour. De même si vous
prenez des anticoagulants (p. ex. Aspirine, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis...) ou si vous avez des problèmes de coagulation, cette intervention n'est pas possible en ambulatoire.
Les complications d'une coloscopie sans ablation de polypes sont rares.

Après l'examen :

Lorsque l'examen est terminé (après 10 à 30 minutes en moyenne), vous êtes reconduit à l'hôpital de jour où vous pouvez dormir. L'air insufflé peut provoquer des crampes passagères. Ce désagrément disparaît après plusieurs passages aux toilettes.
Une fois réveillé, vous recevez un repas à base de pain. Ensuite, le médecin vient vous communiquer le résultat de l'examen et vous recevez un rapport à remettre à votre médecin généraliste.
Attention ! Comme l'effet de l'injection peut encore persister quelques heures, vous ne pouvez pas conduire un véhicule après cet examen. Veuillez prévoir un transport pour rentrer chez vous.

Lu et approuvé
Signature et nom du patient :