Sint-Maria Halle
ALGEMEEN ZIEKENHUIS


Dr. Johan PONETTE
Dr. Katrien BULTE
Dr. Guido SPANOGHE
Dr. Thomas VAN NIEUWENHOVE
tel. 02 363 66 00

INFORMATIE OVER COLOSCOPIE met Plenvu®

Datum: Er werd een afspraak gepland voor een coloscopie op ……,
je wordt die dag om **07.00 uur nuchter** in het dagziekenhuis verwacht.

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een onderzoek waarbij de dikke darm door middel van een videoscoop onderzocht wordt.
De beelden worden sterk vergroot op een televisiescherm weergegeven.



Voorbereiding op de coloscopie:

- Ga vooraf naar de apotheek en **koop een doos Plenvu®** aan, dit kan zonder voorschrift.
  In één doos zitten 1 zakje van 'dosis 1' en 2 zakjes van 'dosis 2'.
- **De avond vóór het onderzoek, om 18.00u.**
  Los het zakje 'dosis 1' van Plenvu® op in 0,5 liter water. Drink deze oplossing in een tijdspanne van ongeveer 1 uur tijd op. Daarna drink je nog 0,5 liter gewoon water.
  Nadien mag je enkele beschuiten of wit brood eten.
- **De ochtend van het onderzoek** breng je de andere 2 zakjes 'dosis 2' van Plenvu® mee naar het dagziekenhuis waar de rest van de voorbereiding wordt uitgevoerd.
  De verpleegkundige zal jou hiermee begeleiden tot de darm perfect gespoeld is.

Het onderzoek zelf:

Na het plaatsen van een intraveneus infuus word je naar het endoscopielokaal gebracht.
Hier krijgt je een inspuiting met een pijnwerend en een slaapverwekkend middel zodat het onderzoek zo goed mogelijk verdragen wordt.
Via de anus wordt de coloscoop voorzichtig ingebracht tot op het einde van de dikke darm.
Nadien wordt de scoop geleidelijk teruggetrokken om alles nog eens goed te bekijken.
Indien er kleine poliepen worden gevisualiseerd, kunnen deze onmiddellijk verwijderd worden. Dit gebeurt door middel van een lus die doorheen het instrument wordt ingebracht en over de poliep wordt aangespannen. Door middel van elektrocoagulatie wordt de poliep "afgesneden". De twee mogelijke verwikkelingen hierbij zijn een bloeding en een perforatie (dit gebeurt wanneer er een gaatje in de darmwand optreedt). De kans op deze verwikkelingen is uiterst klein. Grotere poliepen worden niet via het dagziekenhuis verwijderd. Ook als je bloedverdunners (vb. Aspirine®, Marcoumar®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, ...) gebruikt of stollingsproblemen vertoont, is dit ambulant niet mogelijk. Bij een coloscopie zonder wegname van poliepen kunnen slechts in zeldzame situaties verwikkelingen optreden.

Na het onderzoek:

Als het onderzoek is afgelopen (na gemiddeld 10 tot 30 minuten), word je opnieuw naar het dagziekenhuis vervoerd waar je kan uitslapen. Door de ingeblazen lucht kan je tijdelijk krampen ervaren. Dit ongemak verdwijnt nadat je enkele keren naar het toilet bent geweest.
Eens goed wakker, krijg je een broodmaaltijd.
In het begin van de namiddag komt de dokter jou het resultaat van het onderzoek meedelen en krijg je tevens een verslag mee voor de huisdokter.
Let op! Omdat het effect van de inspuiting nog enkele uren kan aanhouden, is het niet toegestaan om na dit onderzoek een voertuig te besturen. Gelieve vervoer te voorzien om naar huis te gaan.

Gelezen en goedgekeurd
Handtekening en naam patiënt: