


INFORMATIE OVER COLOSCOPIE met Plenvu® THUISVOORBEREIDING

Datum: Er werd een afspraak gepland voor een coloscopie op,
je wordt die dag om **uur nuchter** in het dagziekenhuis verwacht.
Ten laatste om 17.30 u moet je worden afgehaald door een chauffeur, plan dit vooraf.

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een onderzoek waarbij de dikke darm door middel van een videoscoop onderzocht wordt. De beelden worden sterk vergroot op een televisiescherm weergegeven.



Vorbereiding op de coloscopie:

- Ga vooraf naar de apotheek en **koop een doos Plenvu®** aan, dit kan zonder voorschrift. In één doos zitten 1 zakje van 'dosis 1' en 2 zakjes van 'dosis 2'.
- **De avond vóór het onderzoek, om 18.00u.**
Los het zakje 'dosis 1' van Plenvu® op in 0,5 liter water. Drink deze oplossing in een tijdspanne van ongeveer 1 uur tijd op. Daarna drink je nog 0,5 liter gewoon water.
Nadien mag je enkele beschuiten of wit brood eten.
- **De ochtend van het onderzoek, om 08.00u.**
Los de 2 zakjes 'dosis 2' van Plenvu® op in 0,5 liter water. Ook nu drink je deze oplossing in een tijdspanne van ongeveer 1 uur tijd op en drink je daarna nog 0,5 liter gewoon water.
De hele ochtend en middag mag je niets eten, want je moet nuchter zijn voor het onderzoek.

Het onderzoek zelf:

Na het plaatsen van een intraveneus infuus word je naar het endoscopielokaal gebracht. Hier krijgt je een inspuiting met een pijnwerend en een slaapverwekkend middel zodat het onderzoek zo goed mogelijk verdragen wordt. Via de anus wordt de coloscoop voorzichtig ingebracht tot op het einde van de dikke darm. Nadien wordt de scoop geleidelijk teruggetrokken om alles nog eens goed te bekijken. Indien er kleine poliepen worden gevisualiseerd, kunnen deze onmiddellijk verwijderd worden. Dit gebeurt door middel van een lus die doorheen het instrument wordt ingebracht en over de poliep wordt aangespannen. Door middel van elektrocoagulatie wordt de poliep "afgesneden". De twee mogelijke verwikkelingen hierbij zijn een bloeding en een perforatie (dit gebeurt wanneer er een gaatje in de darmwand optreedt). De kans op deze verwikkelingen is uiterst klein. Grotere poliepen worden niet via het dagziekenhuis verwijderd. Ook als je bloedverdunners (vb. Aspirine®, Marcoumar®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, ...) gebruikt of stollingsproblemen vertoont, is dit ambulantly niet mogelijk. Bij een coloscopie zonder wegname van poliepen kunnen slechts in zeldzame situaties verwikkelingen optreden.

Na het onderzoek:

Als het onderzoek is afgelopen (na gemiddeld 10 tot 30 minuten), word je opnieuw naar het dagziekenhuis vervoerd waar je kan uitslapen. Door de ingeblazen lucht kan je tijdelijk krampen ervaren. Dit ongemak verdwijnt nadat je enkele keren naar het toilet bent geweest. Eens goed wakker, krijg je een broodmaaltijd. Daarna komt de dokter jou het resultaat van het onderzoek meedelen en zal je ook een verslag meekrijgen voor de huisdokter.

Let op! Omdat het effect van de inspuiting nog enkele uren kan aanhouden, is het niet toegestaan om na dit onderzoek een voertuig te besturen. Gelieve vervoer te voorzien om naar huis te gaan.

Gelezen en goedgekeurd

Handtekening en naam patiënt: