



“Kalinox®” bewuste sedatie bij kinderen bij kortdurende pijnlijke ingrepen

informatiefolder voor ouders

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen aan de artsen of verpleegkundigen.

E 21 - versie 05/2017 - Een uitgave van het AZ Sint-Maria Halle vzw.

AZ Sint-Maria | dienst Pediatrie
 Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
 tel. 02 363 65 30 | www.sintmaria.be

pediatrisch verpleegkundige dagziekenhuis
 Marleen | tel. 02 363 65 35

 **Sint-Maria Halle**
 ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
 ond. nr. 0467.967.491

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
 tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10
www.sintmaria.be

 **Sint-Maria Halle**
 ALGEMEEN ZIEKENHUIS

Beste ouders

Vandaag moet uw kind een pijnlijke of onaangename handeling ondergaan.

Hiermee bedoelen we een handeling zoals een bloedafname, het plaatsen van een infuusje, het verwijderen van parelwrattjes, het verzorgen van een wonde,...

Om dit aangenamer te laten verlopen, kan de dokter voorstellen om Kalinox® toe te dienen. In deze informatiebrochure willen we u wat meer informatie geven over dit geneesmiddel.

Wat is Kalinox®?

Kalinox® is een **veilig**, kleurloos en reukloos gasmengsel dat bestaat uit de helft zuurstof en de helft lachgas.

Dit kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 3 jaar.

Voordelen van Kalinox®

Bij de toediening van Kalinox® zal uw kind niet inslapen, maar zich wel ontspannen. Terwijl uw kind blijft reageren, verdwijnt de angst en vermindert de pijn.



Indien uw kind het maskertje niet aanvaardt, kan de dokter een ander procedure voorstellen.

Bijwerkingen van Kalinox®

De toediening van Kalinox® is een **veilige** en **kindvriendelijke** procedure.

Uw kind kan zich wel wat anders gaan gedragen en anders reageren dan normaal. Zo kan uw kind beginnen lachen, emotioneel reageren of dingen zeggen die niet volledig juist zijn. Uw kind kan tintelingen voelen aan de mond, de handen of de voeten of kan zich duizelig voelen of hoofdpijn krijgen. (heel uitzonderlijk kan uw kind zich misselijk beginnen voelen, vnl. als het net gegeten heeft)

Het is mogelijk dat uw kind zich de procedure nadien niet meer herinnert (=amnesie).



Deze bijwerkingen zijn niet gevaarlijk voor uw kind en deze verdwijnen enkele minuten nadat uw kind stopt met het inademen van Kalinox®.

Moet uw kind nuchter zijn?

Uw kind hoeft niet nuchter te zijn voor het toedienen van Kalinox®.

Het is wel aangewezen niet te eten net voor de ingreep.

Hoe verloopt de interventie?

De verpleegkundige installeert uw kind in de onderzoekskamer en wordt aangesloten aan de monitor. Zo kan de hartslag en het zuurstofgehalte in het bloed opgevolgd worden.

Vervolgens vragen wij aan uw kind om een maskertje op het gezicht te plaatsen en rustig in en uit te ademen. Nadat uw kind 3 minuten Kalinox® heeft ingeademd, voert de verpleegkundige of dokter de handeling uit. Uw kind blijft Kalinox® inademen totdat de handeling gedaan is.

Na afloop van de handeling, krijgt uw kind gedurende een vijftal minuten zuurstof toegediend en zal de verpleegkundige nog even uw kind observeren.

Als uw kind zich goed voelt en geen klachten heeft, kunnen jullie de onderzoekskamer verlaten.