


Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
ond. nr. 0467.967.491

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10
www.sintmaria.be



Therapie met Metastron®

informatiefolder voor patiënten



Bij problemen of verdere vragen kunt u altijd terecht op de dienst Nucleaire Geneeskunde
tel. 02 363 64 11

Dr. Nicolas Dumarey
Arts Specialist Nucleaire Geneeskunde

Dr. Ilse Mertens
Arts Specialist Nucleaire Geneeskunde

U bent, in overleg met uw behandelende arts, doorverwezen naar de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria voor een behandeling met Metastron®. In deze folder willen wij u informeren over de behandeling en de gang van zaken.

Doel van de behandeling

Na overleg met uw behandelende arts werd beslist uw pijn te behandelen met een injectie van een radioactieve stof, Metastron®. De bedoeling is hierna uw pijnstillers te kunnen verminderen.

Het effect van deze behandeling begint pas na een 2-tal weken; bij sommige patiënten treedt de eerste dagen na toediening van de Metastron® een opflakking op van de pijn. Dit komt door de opname van het product in het bot, wat soms kan gepaard gaan met extra pijn. U kunt dan best tijdelijk een extra pijnstiller innemen.

De behandeling

De toediening gebeurt op de dienst Nucleaire Geneeskunde. Langs een bloedvat wordt het product toegediend en via een baxter wordt gedurende enkele uren nagespoeld.

Te nemen maatregelen

Het grootste deel van het geneesmiddel gaat naar uw beenderstelsel om de pijn te verlichten. De rest zal via urine worden uitgeplast. Waar moet u op letten?

- Maak gedurende de eerste 48 uren zittend gebruik van het toilet en spoel tweemaal door. Tracht geen urine te morsen rond het toilet.
- Mocht u toch wat urine gemorst hebben op het toilet (spoel dit met veel water na), de kleding of het beddengoed dan is dat geen reden tot paniek.
- De te nemen maatregelen zijn erop gericht anderen niet in contact te brengen met de urine waarin de radioactieve stof aanwezig is.
- Wasgoed dat door urine besmet is dient u eenmaal apart te wassen, daarna kan het weer normaal gebruikt worden.
- Wanneer u naar het toilet bent geweest of wanneer u in aanraking bent gekomen met materiaal dat besmet is door urine, moet u uw handen grondig wassen met veel water.

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

Wanneer u hoge koorts zou krijgen, dient u uw arts te verwittigen.

Aandachtspunten voor verdere opvolging

- Na een 6-tal weken is het best uw bloed te laten controleren door uw huisarts.
- Als deze behandeling geholpen heeft en u zou na enkele maanden opnieuw pijn krijgen, kan deze behandeling nog herhaald worden.