


Tips

- Toon aan uw kind hoe hij/zij goed de puff moet inhaleren.
- Een slokje water drinken voor het inhaleren kan een hoestreflex vermijden.
- Op de meeste dosisinhalatoren staat het aantal dosissen. Zo niet, haalt men het spuitbusje uit de houder en legt men het in het water. Het reservoir goed drogen voor je hem terug in de houder plaatst.



- U spoelt best het neusje van uw kind voor u de inhalatietherapie uitvoert.
- Bij baby's: u geeft best de flesvoeding nadat u de inhalatietherapie hebt uitgevoerd.



- 1 Verwijder het achterstuk en koppel het voorstuk los.
- 2 Laat de delen 15 minuten in een milde oplossing van vloeibaar afwasmiddel en schoon, lauwwarm water.
- 3 Beweeg ze voorzichtig heen en weer.
- 4 Spoel de delen nadien af met water en laat ze rechtop drogen aan lucht. Niet droogwrijven.
- 5 Zorg ervoor dat de onderdelen goed droog zijn voordat u ze weer gebruikt.



Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
ond. nr. 0467.967.491

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10
www.sintmaria.be

E 37 - versie 04/2017 - Een uitgave van het AZ Sint-Maria Halle vzw.

Inhalatietherapie bij kinderen

Puff met voorzetkamer

Indien u nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen aan de artsen of verpleegkundigen.



Sint-Maria Halle
ALGEMEEN ZIEKENHUIS



Beste ouders,




Uw kind is zojuist opgenomen op de dienst pediatrie. Tijdens het verblijf kan het zijn dat uw kind vloeistoffen/poeders zal moeten inhaleren. In deze brochure geven wij u graag wat informatie over het geven van inhalatietherapie op onze afdeling.

Wat is inhalatietherapie?

Inhalatietherapie is het toedienen van medicatie in een hoge concentratie ter hoogte van de longen, gebruikmakend van de luchtstromingen tijdens de ademhaling. Het is de therapie waarbij er door te verstuiven of vernevelen van een geneesmiddel via mond of neus aandoeningen van de luchtwegen kunnen behandeld worden.

Heeft inhalatie therapie voordelen?

Een snelle werking van de medicatie → het medicijn is dus onmiddellijk actief. Er zijn minder bijwerkingen omdat de medicatie niet via de bloedbaan worden opgenomen. Er is ook een lagere dosis medicatie nodig voor hetzelfde effect als bij een orale inname.



Puff met voorzetskamer

Bij kleine kinderen is de afstand tussen de puff en de keel korter dan bij volwassenen. Wanneer er een slechte coördinatie is tussen afvuren en inhaleren komt niets in de longen terecht. Ook kunnen kinderen op het einde van een ademhaling niet zomaar even hun adem inhouden. Daarom is het van groot belang de puff in een kamer met kleppen op te vangen (=voorzetskamer). Een voorzetskamer is een grote peer- of buisvormige koker.

Het doel van een puff met een voorzetskamer te gebruiken is de inhalatie van de geneesmiddelen te verbeteren en te vereenvoudigen. Er is dus geen juiste handademcoördinatie nodig omdat de medicatie in de voorzetskamer even blijft hangen. Tussen de voorzetskamer en de mond kan men gebruik maken van een:

Masker

(Voor kinderen jonger dan 6 jaar)

Mondstuk

(Voor kinderen vanaf 6 jaar)

Techniek:

Uw kind moet zo recht mogelijk zitten. Neem het dopje van het mondstuk van de puff. Schud de puff krachtig edurende enkele seconden.

Sluit de puff aan op de voorzetskamer.

Plaats het mondstuk van de voorzetskamer in de mond (tussen de tanden) en laat uw kind goed met de lippen omsluiten (zie foto 2) of zet het masker rond de mond (zie foto 1). Duw op de puff.

Het kind moet binnen de 20 seconden klaar zijn met ademen. Er wordt aangeraden het kind vijf keer te laten ademen. Moedig het kind vanaf het kan aan om diep in en uit te ademen. Herhaal stap 6 indien u 2x moet puffen of een ander medicijn moet geven.

Verwijder de puff en plaats het dopje terug op het mondstuk van de inhalator. Spoel de mond met water (niet inslikken).

Een baby mag je water laten drinken.