


INFORMATIE OVER COLOSCOPIE ONDER NARCOSE

Datum:

Er werd voor u een afspraak gepland opom uur **nuchter** in het dagziekenhuis.
Ten laatste om 17.30 u dient u te worden afgehaald door een chauffeur.

Wat is een coloscopie?

Een coloscopie is een onderzoek waarbij de dikke darm door middel van een videoscoop onderzocht wordt. De beelden worden sterk vergroot op een televisiescherm weergegeven.



Vorbereiding:

De avond vóór het onderzoek lost u om 18.00 u in 1 liter water 1 zakje A en 1 zakje B van Moviprep op (in één doos zitten 2 zakjes A en 2 zakjes B).

Vervolgens drinkt u de oplossing in een tijdspanne van ongeveer 1 uur tijd op.

Daarna drinkt u nog 1,5 liter gewoon water. Nadien mag u enkele beschuiten of wit brood eten.

De ochtend van het onderzoek drinkt u om 6.00 uur opnieuw 1 liter water waarin de overblijvende zakjes A en B van Moviprep zijn opgelost over een tijdspanne van 1 uur, gevolgd door nog 1,5 liter gewoon water. Na 8.00 uur mag u niets meer drinken.

Het onderzoek zelf:

Na het plaatsen van een intraveneus infuus wordt u naar het endoscopielokaal gebracht.

Hier krijgt u een inspuiting met een pijnwerend en een slaapverwekkend middel zodat het onderzoek zo goed mogelijk verdragen wordt.

Via de anus wordt de coloscoop voorzichtig ingebracht tot op het einde van de dikke darm. Nadien wordt de scoop geleidelijk teruggetrokken om alles nog eens goed te bekijken.

Indien er kleine poliepen worden gevisualiseerd, kunnen deze onmiddellijk verwijderd worden.

Dit gebeurt door middel van een lus die doorheen het instrument wordt ingebracht en over de poliep wordt aangespannen. Door middel van elektrocoagulatie wordt de poliep "afgesneden". De twee mogelijke complicaties hierbij zijn een bloeding en een perforatie (dit gebeurt wanneer er een gaatje in de darmwand optreedt). De kans op deze complicaties is uiterst klein. Grotere poliepen worden niet via het dagziekenhuis verwijderd. Ook als u bloedverdunders (vb. Aspirine, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis, ...) gebruikt of stollingsproblemen vertoont, is dit ambulant niet mogelijk. Bij een coloscopie zonder wegnahme van poliepen kunnen slechts in zeldzame situaties complicaties optreden.

Na het onderzoek:

Als het onderzoek is afgelopen (na gemiddeld 10 tot 30 minuten), wordt u opnieuw naar het dagziekenhuis vervoerd waar u kan uitslapen.

Door de ingeblazen lucht kan u tijdelijk krampen ervaren. Dit ongemak verdwijnt nadat u enkele keren naar het toilet bent geweest.

Eens goed wakker, krijgt u een broodmaaltijd. Daarna komt de dokter u het resultaat van het onderzoek meedelen en krijgt u tevens een verslag mee voor de huisdokter.

Let op! Het is niet toegestaan na dit onderzoek een voertuig te besturen. Gelieve vervoer te voorzien om naar huis te gaan.

Gelezen en goedgekeurd

Handtekening en naam patiënt: