



## Digestieve oncologie

### **Algemeen:**

Bij eventuele vragen/problemen kan u steeds contact opnemen met het dagziekenhuis via tel 02 363 62 15.

**Bij koorts** (éénmalig  $> 38.5^{\circ}\text{C}$  of  $2 \times > 38.0^{\circ}\text{C}$  met 1 uur tussen beide metingen) is een snelle bloedname (compleet met neutrofielen, CRP, enz.) aangewezen, bij voorkeur via huisarts of spoedopname. Bij aanwezigheid van  $< 1000$  neutrofielen is hospitalisatie aangewezen voor toediening van breedspectrum antibiotica.

### **Anti-emetica:**

- Bij misselijkheid : Litican tot 6 co's per dag zo nodig of Motilium SL 3/d
- Novaban 5 mg of Zofran 5 mg 1/dag gedurende 3-5 dagen
- Zo onmogelijk comprimés in te nemen: Primperan suppo's 20 mg tot 3 /dag

### **Aften**

- Perio-aid mondspoeling 2 x per dag
- Kamillosan mondspoeling
- zo onvoldoende: Mucositiscocktail tot 6 keer per dag

### **Mucositiscocktail**

Hydrocortisone 200 mg  
Lidocaine Hcl 400 mg  
Nilstat 30 ml  
Excipients tot 500 ml

### **Constipatie:**

Movicol of Forlax zakjes en zo onvoldoende Laxoberon druppels associëren (15 druppels per toediening)

### **Diarree:**

Imodium 2comprimés ineens, nadien 1co bij elke losse stoelgang, tot 6co per dag.



## Chemotherapie schema's: (meest voorkomende)

### FOLFOX

In dit chemotherapie schema wordt het alkylenderend agens Oxaliplatin toegediend aan een dosis van 85mg/m<sup>2</sup> op dag 1 in combinatie met Elvorine 100mg/m<sup>2</sup> op dag 1 en 2, een 5-Fluoro-Uracyl (5-FU) bolus van 400mg/m<sup>2</sup> op dag 1 en 2 en een 5FU continu infuus (1200mg/m<sup>2</sup>) via infusor op dag1 en 2 over tweemaal 22uur. Op dag 3 wordt de infusor verwijderd.

Mogelijke nevenwerkingen van oxaliplatin zijn nausea, braken, myelosuppressie (anemie, leucopenie en trombopenie), diarree, mucositis, perifere neuropathie, vermoeidheid, anorexie en krampen (getriggerd door koude). Drinken van koude (en warme dranken) dient vermeden worden tijdens de toediening van de chemotherapie)

Mogelijke nevenwerkingen van 5-FU zijn diarree, nausea en braken, mucositis, anorexie, waterige ogen, smaakverlies, myelumsuppressie, nagelveranderingen, droge huid en zelden hand-voet syndroom

### FOLFIRI

In dit chemotherapie schema wordt de topo-isomerase inhibitor irinotecan (Campto) toegediend aan een dosis van 180 mg/m<sup>2</sup> op dag 1 in combinatie met Elvorine 100mg/m<sup>2</sup> op dag 1 en 2, 5-Fluoro-Uracyl (5FU) bolus 400mg/m<sup>2</sup> op dag 1 en 2, 5FU continu infuus (1200mg/m<sup>2</sup>) via infusor op dag1 en 2 over 22uur. Op dag 3 wordt de infusor verwijderd.

Dit schema wordt 2 wekelijks herhaald.

Mogelijke nevenwerkingen van campto zijn laattijdige diarree, nausea en braken, vermoeidheid, myelosuppressie, alopecia, anorexie en zeldzaam een acuut cholinerg syndroom.

Mogelijke nevenwerkingen van 5-FU zijn diarree, nausea en braken, mucositis, anorexie, waterige ogen, smaakverlies, myelumsuppressie, nagelveranderingen, droge huid en zelden hand-voet syndroom

### GEMCITABINE

In dit chemotherapieschema wordt het anti-metabooliet gemcitabine toegediend aan een dosis van 1000 mg/m<sup>2</sup> op dag 1.

Deze chemotherapie wordt wekelijks herhaald via het dagziekenhuis. De eerste cyclus bevat 7 kuren met nadien een week rust en herevaluatie. Vanaf dan bestaat een cyclus uit drie kuren met een week rust. Dit schema wordt over het algemeen goed verdragen.

Mogelijke nevenwerkingen van gemcitabine zijn een griepaal syndroom, koorts, vermoeidheid, nausea en braken, anorexie, myelosuppressie en zelden alopecia, diaree en mucositis.



### **DE GRAMONT**

In dit chemotherapieschema wordt Elvorin 100 mg/m<sup>2</sup> op dag 1 en dag 2 toegediend, een bolus 5-Fluoro-Uracil (5FU) gegeven van 400 mg/m<sup>2</sup> op dag 1 en dag 2, en vervolgens via continu infuus 5-FU aan een dosis van 600 mg/m<sup>2</sup>/dag op dag 1 en dag 2. De derde dag wordt het pompje 5-FU afgeschakeld. Dit schema wordt 2 wekelijks herhaald.

### **GEMZAR CISPLATINUM**

In dit chemotherapieschema wordt gemcitabine toegediend aan 1000 mg/m<sup>2</sup> in combinatie met cisplatinum 20mg/ smaakveranderingen, anorexie, neurotoxiciteit, ototoxiciteit, nefrotoxiciteit en soms alopecie m<sup>2</sup> beide op dag 1 en dag 8. Dit schema wordt 3 wekelijks herhaald.

Mogelijke nevenwerkingen van gemcitabine zijn een griepaal syndroom, koorts, vermoeidheid, nausea en braken, anorexie, myelosuppressie en zelden alopecia, diarree en mucositis.

Mogelijke nevenwerkingen van cisplatinum zijn nausea, braken, myelosuppressie (anemie, leucopenie en trombopenie), vermoeidheid, diarree, stomatitis,

### **AVASTIN**

Avastin (bevacizumab) is een monoclonaal antistof gericht tegen VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Hierdoor wordt angiogenese geremd. Het wordt toegediend aan een dosis van 5mg/kg om de 2 weken. Mogelijke nevenwerkingen zijn hypertensie, thrombo-embolische fenomenen, proteïnurie (nefrotisch syndroom) en een vertraagde wondheling