


Tips

- Toon aan uw kind hoe hij/zij goed de puff moet inhaleren.
- Een slokje water drinken voor het inhaleren kan een hoestreflex vermijden.
- Op de meeste dosisinhalatoren staat het aantal dosissen. Zo niet, haalt men het spuitbusje uit de houder en legt men het in het water. Het reservoir goed drogen voor je hem terug in de houder plaatst.



- U spoelt best het neusje van uw kind voor u de inhalatietherapie uitvoert.



Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw
ond. nr. 0467.967.491

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle
tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10
www.sintmaria.be



Inhalatietherapie bij kinderen

Puff zonder voorzetkamer

*Indien u nog vragen hebt,
aarzel dan niet om deze te stellen
aan de artsen of verpleegkundigen.*



Beste ouders,

Uw kind is zojuist opgenomen op de dienst pediatrie. Tijdens het verblijf kan het zijn dat uw kind vloeistoffen/poeders zal moeten inhaleren. In deze brochure geven wij u graag wat informatie over het geven van inhalatietherapie op onze afdeling.

Wat is inhalatietherapie?




Inhalatietherapie is het toedienen van medicatie in een hoge concentratie ter hoogte van de longen, gebruikmakend van de luchtstromingen tijdens de ademhaling. Het is de therapie waarbij er door te verstuiven of vernevelen van een geneesmiddel via mond of neus aandoeningen van de luchtwegen kunnen behandeld worden.

Heeft inhalatie therapie voordelen?

- Een snelle werking van de medicatie → het medicijn is dus onmiddellijk actief.
- Er zijn minder bijwerkingen omdat de medicatie niet via de bloedbaan worden opgenomen.
- Er is ook een lagere dosis medicatie nodig voor hetzelfde effect als bij een orale inname.

Puff zonder voorzetskamer

Een puff zonder voorzetskamer wordt gegeven vanaf zes jaar omdat we deze kinderen de juiste techniek kunnen aanleren. Zonder voorzetskamer wil zeggen dat we enkel het spuitbusje en de plastic houder hebben. In deze puffers bevinden zich fijn verdeelde geneesmiddeltjes die in een tot vloeistof geperst gas rondzweven. Als men de puff indrukt, komt er een aangepaste hoeveelheid medicatie vrij samen met het drijfgas. De dosisinhalator is voor één patiënt en wordt dus individueel gebruikt.



Techniek:

Uw kind moet zo recht mogelijk zitten. Neem de beschermkap van het mondstuk. Schud de puff krachtig gedurende enkele seconden (foto 3). Laat uw kind rustig en volledig uitademen (nooit uitademen in de inhalator) (foto 4). Plaats het mondstuk in de mond (tussen de tanden) en laat uw kind goed met de lippen omsluiten (foto 5). Uw kind begint langzaam en diep in te ademen en druk op hetzelfde moment de puff in. Nadien blijf hij/zij verder inademen. Uw kind moet zijn/haar adem 5 à 10 seconden in houden en neem de inhalator uit de mond. Nadien mag hij/zij rustig door de mond uitademen. Plaats de dop terug op het mondstuk. Laat uw kind zijn/haar mond spoelen met water (niet inslikken).