

## Kostprijs


Het ziekenhuis van Halle wil kwalitatieve en patiëntveilige zorg hoog in het vaandel dragen. Om dit te realiseren en daarbij de snelle technologische evolutie te kunnen blijven volgen, worden er voor radiologie honorariumsupplementen gehanteerd. De radiologen zijn aldus niet geconventioneerd.

Dit betekent dat u na tussenkomst van het ziekenfonds het persoonlijk aandeel (remgeld) en een honorariumsupplement betaalt. Voor deze specifieke behandeling betaalt u ook een toeslag van 11 euro. Ter plaatse hoeft u niets te betalen; u ontvangt een factuur waarbij het remgeld en het honorariumsupplement ten uwen laste is.

### Medische Beeldvorming radiologie | MRI | echografie

Dr. Dirk Crombé  
Dr. Laura Dewachter  
Dr. Robin Peters  
Dr. Bart Van Den Bossche  
Dr. Lennert Van Muylder

Secretariaat Medische Beeldvorming  
tel. 02 363 64 21  
maandag - vrijdag | 7u15 - 21u00  
zaterdag | 8u30 - 12u30



Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria vzw  
ond. nr. 0467.967.491

Ziekenhuislaan 100 | 1500 Halle  
tel. +32 (0)2 363 12 11 | fax +32 (0)2 363 12 10  
www.sintmaria.be

## Barbotage behandeling van de schouder

informatiefolder voor patiënten

*Indien u nog vragen hebt,  
aarzel dan niet om deze te stellen  
aan de artsen of verpleegkundigen.*





## Wat is een barbotage?

Dit onderzoek laat toe een pijnlijke calcificatie te fragmenteren of uit te wassen, afhankelijk van het type calcificatie. De procedure wordt onder echografie uitgevoerd om de juiste positie van de naald te verzekeren

Het onderzoek heeft geen zin als de calcificaties reeds doorgebroken zijn naar de slijmbeurs van de schouder. Indien de radioloog dit vaststelt, kan het onderzoek niet doorgaan (hier volstaat louter anti-inflammatoire medicatie type ibuprofen en eventuele cold pack).

## Vorbereiding

U bent niet in staat om zelf naar huis te rijden of te fietsen na het onderzoek. Regel daarom van te voren vervoer.

## Verloop van het onderzoek.

U ligt op een onderzoekstafel gedurende de volledige duur van het onderzoek.

Na grondige desinfectie, voert de radioloog een locale verdoving uit. Afhankelijk van het type calcificatie plaatst de radioloog een naald in de calcificatie om deze hetzij uit te spoelen, hetzij te fragmenteren.

Aansluitend wordt de schouder-slijmbeurs geïnfiltrerd met corticoiden.

Het onderzoek duurt 15-20 min.

## Na het onderzoek:

U kan de dienst gewoon verlaten, doch vergezeld. Tengevolge van de uitgevoerde procedure kan een pijnlijke crisis optreden binnen de 24-48 uur. Dit is onderdeel van het genezingsproces en zwakt geleidelijk af.

Uw voorschrijvende arts zal u daarom pijnstilling voorschrijven. Een coldpack is eveneens aan te raden. Indien u fysiotherapie heeft verzoeken we u contact op te nemen met uw behandelende arts om dit eventueel uit te stellen.

## Complicaties?

Zoals voor elke punctie bestaat er een risico voor infectie, doch alle voorzorgen worden genomen om dit te vermijden. We werken strikt aseptisch.

Voor diabetici kan er een ontregeling van de suikerspiegel optreden gedurende de eerste 48 uur.

Barbotage heeft 80% succes. Indien we desondanks de ingreep dienen te herhalen moet er 8 weken tussen zitten.